

PODODERMATITIS EN POLLOS DE ENGORDE

Las razas de pollos de engorde, por ejemplo los Broiler, han sido seleccionadas tradicionalmente para la producción de carne. Éste hecho implica en muchos ejemplares de éstas razas una predisposición a enfermedades y problemas relacionados con su conformación. Uno de los más frecuentes es la pododermatitis, es decir, ulceración de la zona plantar de las patas como consecuencia principalmente del peso de éstos animales, capacidad de movimiento limitada, malnutrición y condiciones de higiene deficientes. Curar un pollo Broiler de pododermatitis es muy costoso y lleva mucho tiempo, y en muchos casos el sacrificio es la única opción si la infección de la zona afecta a una amplia zona e implica osteomielitis severa sin respuesta al tratamiento.



Aspecto de una pododermatitis grave. Se observa una gran escara bajo la que hay tejido infectado.



Aspecto tras 7 semanas de tratamiento con curas semanales bajo anestesia.



Aspecto tras una sesión de curas bajo anestesia antes de aplicar un vendaje.



Vendaje protector con acolchado incorporado.

C. V. MADRID EXÓTICOS

CIF: E 84219880

C/ Meléndez Valdés 17. Hf. 91 446 08 24 urgencias 619 91 51 21

28015 MADRID

www.cvmadridexoticos.com